

Havre Ringsaker

Tidlig havre

Tidlighet

Ringsaker har en veksttid på ca 108 dager. Dette er 2 dager tidligere enn Haga og 6 dager tidligere enn Belinda.

Såmengde

1000-kornvekta (TKV) for Ringsaker er målt til ca 31 gram. Med et ønsket plantetall på 525 pl/m² vil såmengden være omtrent 18-20 kg/daa ved en spire% på 90.

Gjødsling

Ringsaker trenger 8-10 kg N per dekar gitt med mineralgjødning eller i kombinasjon med husdyrgjødsel. Gjødselbehovet er størst ved tidlig såing, forventning om høy avling og ensidig korndyrking. Det må tas hensyn til egne erfaringer og lokale forsøksresultater ved valg av gjødselmengder. Økt N-mengde øker faren for legde.

Vekstregulering

Vekstregulering må vurderes ut fra vekstforholdene. Er åkeren frodig og det er gode fuktighetsforhold på 4 til 5-bladstadiet (Z14) bør CCC-sprøyting foretas. Moddus Start kan benyttes fra Z25 til Z32 (synlig andre leddknote). Trimaxx kan brukes fra Z31 (synlig første leddknote) til Z37 (synlig spiss flaggblad). Se Plantevernkatalogen.

Ugraskontroll

Etter busking konkurrerer havre godt mot seint spirende ugras. Sprøyt derfor litt tidlig (når havreplantene har 2,5 – 3 blad) mot frøugras.

Sjukdommer

Ringsaker er sterk med tanke på DON verdier i smitteforsøk. I fuktige år og med ustabil vær rundt blomstring anbefales sprøyting med 60-80 ml Proline. Sprøytetidspunkt er når støvbærerne er synlige.

Avling

I gjennomsnitt for perioden 2017-2019 ligger Ringsaker 4-5 % under Haga i avling på Østlandet og i Trøndelag.

Sortsegenskaper

Ringsaker er tidligste havre. Middels stråstryke, noe langt strå. God HI-vekt, lav tusenkornvekt. Sorten er sterk mot DON i smitteforsøk.

Forsøk med havre 2017-2019. Usprøyta felt. Relativ avling (kg/daa).

Tidlige sorter	Hele Østlandet	Sør-Østlandet	Nord-Østlandet	Trøndelag
Ringsaker	100 (509)	100 (507)	100 (508)	100 (506)
Haga	105	104	105	104
Odal	104	107	101	100
Ridabu	109	107	110	100
Seine sorter				
Belinda	100 (517)	100 (521)	100 (537)	100 (531)
Vinger	97	97	99	98
Våler	102	99	105	100

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020



Sortsegenskaper til havresorter

Sort	Veksttid*	Stråstyrke	Strå-lengde	DON-verdi	Havre-brunflekk	HI-vekt	1000-kornvekt	Skall %	Spire-treghet	Protein %	Fett%
Ringsaker	0	5	5	7	5	7	3	6	7	7	6
Haga	+2	6	7	3	4	6	4	6	4	6	5
Odal	+2	6	5	8	5	7	6	6	3	7	7
Ridabu	+3	7	7	3	5	5	4	6	5	5	6
Vinger	+4	7	5	7	5	6	6	6	3	6	4
Våler	+4	5	6	6	5	5	5	5	4	5	8
Belinda	+6	7	7	3	5	6	7	4	5	6	7

*Veksttid: Antall dager seinere enn Ringsaker

Andre egenskaper: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, høye DON-tall, dårlig sjukdomsresistens, lav HI-vekt/1000-kornvekt, høy spiretreghet, lav protein/fett%
Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020

Sortseier: Graminor

Tlf: 72 50 50 50
www.felleskjøpet.no

