

Havre Dominik

Sein havre – nematodetolerant

Tidlighet

Dominik har en veksttid på ca 114 dager. Dette er omtrent som Belinda.

Såmengde

Såmengden på Dominik kalkuleres utfra tusenkornvekt og spire%. Den vil vanligvis være i området 20-22 kg/daa.

Gjødsling

Dominik gjødsles som Belinda, 9-12 kg N per dekar. Størst mengde brukes ved tidlig såing, forventning om høy avling og ved ensidig korndyrking. Det må tas hensyn til egne erfaringer og lokale forsøksresultater ved valg av gjødselmengder. Økt N-mengde øker faren for legde.

Vekstregulering

Dominik regnes som mjuk i strået, vekstregulering må vurderes utfra vekstforholdene. Er åkeren frodig og det er gode fuktighetsforhold på 4-5-bladstadiet (Z14) bør CCC-sprøyting foretas. Moddus Start kan benyttes fra Z25 til Z32 (synlig andre leddknote). Trimaxx kan brukes fra Z31 (synlig første leddknote) til Z37 (synlig spiss flaggblad). Se Plantevernkatalogen.

Ugraskontroll

Etter busking konkurrerer havre godt mot seint spirende ugras. Sprøyt derfor litt tidlig (når havreplantene har 2,5 – 3 blad) mot frøugras.

Sjukdommer

Dominik er trolig på linje med Belinda med tanke på DON (dvs blant de svakere sortene). Sorten har

høy toleranse for havrecystenematoder.

Avling

Dominik er ikke prøvd i Norge i særlig utstrekning. I et forsøk hos Graminor i 2020 lå den på linje med Belinda.

Sortsegenskaper

Dominik er en sein havre som benyttes der det er mistanke om havrecystenematoder. Minner om Belinda i avling og veksttid, noe mjukere strå.



Sortsegenskaper til havresorter

Sort	Veksttid*	Stråstyrke	Strå-lengde	DON-verdi	Havre-brunflekk	HL-vekt	1000-kornvekt	Skall %	Spire-treghet	Protein %	Fett%
Ringsaker	0	5	5	7	5	7	3	6	7	7	6
Haga	+2	6	7	3	4	6	4	6	4	6	5
Odal	+2	6	5	8	5	7	6	6	3	7	7
Ridabu	+3	7	7	3	5	5	4	6	5	5	6
Vinger	+4	7	5	7	5	6	6	6	3	6	4
Våler	+4	5	6	6	5	5	5	5	4	5	8
Belinda	+6	7	7	3	5	6	7	4	5	6	7

*Veksttid: Antall dager seinere enn Ringsaker

Andre egenskaper: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, høye DON-tall, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt/1000-kornvekt, høy spiretreghet, lav protein/fett%
Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020