

Felleskjøpet sitt sortiment, HØSTSÅDDE VEKSTER

Høsthvete MAT

Lizzie - ny mathvetesort

Ny mathvetesort. Sorten er foredlet av Lantmännen i Sverige, men valgt ut av Graminor på grunnlag av norske forsøk. I gjennomsnitt for de tre siste årene har Lizzie hatt overvintring på nivå med Magnifik og avling 7 % over Kuban. Lizzie vil antakelig overta for Kuban som hovedmatsort.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden.

Kuban - velkjent

Velkjent mathvetesort som har hatt god overvintringsevne. Sorten gir gode avlinger og er svært stråstiv. Kornkvaliteten er god, hektolitervekta høy, og ikke minst den er ønsket av mølleindustrien.

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Bernstein - etterspurt av mølleindustrien

Meget god bakekvalitet og er etterspurt av mølleindustrien. Sorten har dessverre noe dårlig overvintringsevne og er best egnet i de beste dyrkingsområdene.

Såmengde: 23 - 25 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Magnifik - god overvintring

Velkjent sort med markedets beste overvintringsevne. Sorten kan ha noe variabel falltallsstabilitet under vanskelige innhøstingsforhold.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Høsthvete FÔR

Rotax

Fôrhøsthvete med gode overvintringsegenskaper. Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt 4 % større avling enn Jantarka i snitt for de siste tre årene. Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedsort til fôr.

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Jantarka – velkjent hovedsort

Har vært hovedsort av fôrhøsthvete i mange år. Sorten er storkornet og har høyt avlingspotensiale kombinert med god overvintringsevne.

Såmengde: 23 - 25 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Etana – høyt avlingspotensiale

Fôrsort med middels veksttid og høyt avlingspotensiale. God kornkvalitet, men litt stråsvak.

Såmengde: 21-23 kg/dekar

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

SU Hyvega - hybridhøsthvete

Hybridhøsthvete fra Saaten Union. Klassifiseres som brødhvete i Europa, men vi vet ikke om denne blir godkjent til mat i Norge. Markedsføres med å takle utfordrende dyrkingsforhold, ha bedre rotsystem, bedre busking og større aks enn linjesortene. Trolig litt mindre vinterherdig enn de beste markedssortene. Veldig gode avlingsresultater fra forsøk i Tyskland, Polen og Baltikum.

Vi anbefaler å teste ut dyrking i mindre skala, siden vi ikke kjenner dyrkingsegenskapene under våre betingelser så godt. Bør såes tidlig for å få god tid til busking på høsten. Begrenset volum.

Såmengde: Selges på enheter med 500.000 spiredyktige frø. Hver storsekk inneholder 24 enheter og rekker til 80 dekar (150 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: Månedsskiftet august/september.

Chevignon - gode stråegenskaper og god sykdomsresistens

Tidlig sort som ser ut til å ta over markedet for Norin i Sverige. Gode stråegenskaper og god sykdomsresistens. Høyt avlingspotensiale og bra proteinnivå. I Svenske forsøk fra område F (Mällan-Sverige) i perioden 2020-2024 ligger avlingsnivået 13% over Norin og på nivå med Informer.

Chevignon kan være et godt alternativ som forgrøde til høstraps i de tidligste områdene eller for å spre høstetidspunkt i kombinasjon med seinere sorter. Sorten er ikke prøvebakt i Norge og avregnes som fôr.

Såmengde: 21-23 kg/dekar

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Informer - stråstiv og storkornet

En stråstiv sort med et høyt avlingspotensialt. Sterk mot sykdommer, men ikke like vintersterk som de beste sortene. Må gjødsles rett for å oppnå høyt nok proteininnhold. Sorten har langt, men sterkt strå og er storkornet. Fra behandlede ledd i verdiprøving for siste tre år ligger avlingsnivået 19% over Kuban. Om lag 5 dager senere enn Kuban.

Såmengde: 22-24 kg/dekar

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

LG Nida - høy hektolitervekt

Høytytende sort med sterkt gluten, høy hektolitervekt og relativt god overvintringsevne. I perioden 2021-2023 hadde sorten avlingsnivå 9% over Kuban. Sorten er i oppformering, så tilgangen er begrenset.

Såmengde: 22-24 kg/dekar

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Høstrug

KWS Tayo

En av de høyest ytende sortene i svenske og danske forsøk over flere år. Sorten er relativt tråstiv og har god overvintringsevne. KWS-sortene er såkalte Pollen-Pluss sorter. Det vil si at hybridsorten selv produserer tilstrekkelig pollen til å sikre god pollinering og redusere faren for mjøldrøye.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

SU Perspektiv

Etterfølgeren til SU Performer. Gode egenskaper på overvintring, stråstyrke og avling. Helt i topp i norske forsøk fra 2023. Meget sterk mot mjøldrøye i tyske forsøk. For å redusere forekomsten av mjøldrøye i avlinga er det i tillegg blandet inn 10% populasjonsrug i sekkene.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Høstrughvete

Belcanto – gode egenskaper

Vært dyrket noen sesonger i Norge. Sorten har god sykdomsresistens, høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. Belcanto har god resistens mot groing i akset, men litt utsatt for legde.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Panaso

Sort fra Polske Danko. I Graminors forsøk i perioden 2022-2024 ligger gjennomsnittlig avling 22% over Belcanto. I samme forsøk ligger avlingsnivået 34% over fôrhvetesorten Jantarka. Overvintringen er god, selv i vanskelige år som våren 2021. Panaso har god resistens mot groing i akset.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Temuco

Sort fra Lantmännen. Lite utsatt for legde og kort strå. I Graminors forsøk i perioden 2022-2024 ligger gjennomsnittlig avling 9% over Belcanto. I samme forsøk ligger avlingsnivået 20% over fôrhvetesorten Jantarka.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Høstbygg

SY Galileo – høtytende

En meget høtytende seksradshybridsort. Sorten må sås tidlig, seinest første uka i september for å sikre god busking utover høsten. SY Galileo selges som andre hybridsorter i enheter.

Vinterherdigheten på høstbygg er dårligere enn for de andre høstsådde kornartene, men kan gi gode avlinger når det lykkes. Ypperlig forgrøde for høstraps.

Såmengde: 1 storsekk (10 enheter = 10 mill spiredyktige frø) rekker til 60 daa ved tidlig såing og 50 daa ved sein såing (160-200 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: Tidlig såing 20. august - 1. september. Sein såing 25. august til 7. september, rundt Oslofjorden

Høstrybs

Arrivee - godt avlingspotensiale

Vinterherdigheten er noe bedre enn høstraps og vekstpunktet er lavt. Godt avlingspotensial, men ikke helt på høyde med høstraps sortene. Tidligere moden enn høstraps og rask tilvekst på høsten gjør at såtid er senere enn for høstraps (10-14 dager senere). Ved å dyrke høstrybs kan man ofte velge en høyere ytende forgrøde med lengre veksttid enn ved høstrapsdyrking, grunnet senere såtid.

Såmengde: 300 g pr. daa (80-100 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: 20. august - 1. september

Høstraps

Helypse

Vinnende sort i svenske «Rapsmästaren 2024» og også sorten med høyest gjennomsnittsavling av alle sorter i konkurransen. Robust sort med kompakt vekst på høsten, dryssfasthet, god stråstyrke og sykdomsresistens. Vinterherdighet på nivå med Explicit.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Triathlon

Ny lovende høstraps-sort fra NPZ. Vekstsettet kan sammenlignes med Mercedes, men den har bedre avling, sykdomsresistens og er mer dryssfast. Ligger helt i topp i svenske forsøk i kombinasjonen avling og overvintringsevne.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Parcours

Ny sort som ble lansert i 2023. Sorten har høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. Leveres også som ubeiset.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Mercedes

Mercedes er en velkjent sort som har vært med i en del år nå. Sorten har vært bestselger i Norge i flere år. Meget robust sort som klarer overvintringen bra. Relativt kraftig vekst på høsten, men lavt vekstpunkt. Sen vekststart gjør sorten sterk mot frostskafer på våren.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

DK Expat

Er en høytytende sort med god overvintringsevne. Expat erstatter den vekjente sorten Explicit. Helt i topp i svenske forsøk.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

DK Sephor

Dverghybrid med meget god vinterherdighet. Sorten klarer seg bra i områder med mye beiting fra vilt og hard vinter grunnet sitt lave vekstpunkt og kompakt vekst. Dvergsortene bør ikke såes for sent og en bør legge seg noe høyere i såmengde i forhold til andre hybrider.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 23-30 daa (50-65 spiredyktige frø/m²)

Såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

DK Exavance

Meget tidligblomstrende sort som blomstrer en drøy uke før andre sorter. Blomstene vil lokke til seg rapsglansbiller tidlig for å unngå skade på knoppene på hovedsorten. Sorten blandes med rapssorten som såes på resten av feltet. Fortrinnsvis bare på vendeteig og områdene på ytterrundene. Ved å blande en sekk DK Exavance med en sekk vanlig rapsfrø oppnår man en innblanding på om lag 7%.

Såmengde: 1 sekk (100.000 spiredyktige frø) blandes med 1 sekk vanlig rapsfrø

SY Florian

Velkjent sort med høyt avlingspotensial. Sorten bør dyrkes i de beste områdene der den har tilstrekkelig overvintringsevne. Leveres ubeiset.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden